

Avertissements agricoles

DLP 16-9-855598 3

PUBLICATION PERIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la DDA
C.C.P. Montpellier 5238-57

EDITION GENERALE

N° 23 - 13 Septembre 1985

ASPERGE	:	RENOUVELEZ RAPIDEMENT LA PROTECTION CONTRE LE STEMPHYLIUM
CAROTTE	:	OÏDIUM QUELQUES ATTAQUES
CHOU	:	NOCTUELLE ET PUCERONS
POIREAU	:	TEIGNE ET THRIPS RENOUVELEZ LA PROTECTION
TOMATE	:	VOLS IMPORTANTS DE NOCTUELLE, SUR CULTURE D'ARRIÈRE SAISON INTERVENIR RAPIDEMENT.

CULTURES LEGUMIERES

ALEURODES OU MOUCHES BLANCHES

On les rencontre sur de nombreuses cultures de plein air (choux, tomates, aubergines, laitues ...) si leur présence est décelée utiliser :

bioresméthrine	6 g m.a./hl	(Isathrine)
cyperméthrine	5 "	(Ripcord, Kafil, Cymbush)
deltaméthrine	1,25 "	(Décis)
méthomyl	50 "	(Lannate)

Respecter les délais d'emploi avant récolte.

ASPERGE

STEMPHYLIUM

Renouveler la protection à l'aide de chlorothalonil, iprodione, mancozèbe, manèbe, (voir bulletin n° 20 du 1er août).

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

EDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON

Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, Place Chaptal

34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. (67) 92.41.42

Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles

- Le Directeur, M. FREYDIER

- N° d'inscription 531 AD



7494

OIDIUM

Des attaques faibles, mais qui risquent de prendre de l'ampleur avec les arrosages et les rosées sont observées dans plusieurs parcelles. On interviendra à l'aide de :

chinométhionate	7,5 g m.a./hl	(Morestan)
dinocap	18,25 "	(nombreuses spécialités)

Les arrosages seront effectués le matin.

C É L E R I**SEPTORIOSE**

Dans les jeunes plantations réaliser un traitement à l'aide de :

captafol	160 g m.a./hl	(nombreuses spécialités)
" + carbendazime	80 + 20 g m.a./hl	(Cérétal)
chlorothalonil	150 g m.a./hl	(Daconil)
" + carbendazime	110 + 80 g m.a./hl	(Bravo plus, Céréclair)
mancozèbe	160 g m.a./hl	(Dithane)
propiconazole + carbendazime		(Tilt C) (non homologué)

C H O U**NOCTUELLES**

Renouveler la protection à l'aide de : cyperméthrine, deltaméthrine (voir bulletin n° 22 du 28 août).

PUCERONS

En présence de pucerons et de noctuelles réaliser une application avec : deltaméthrine + hepténophos (Décis B) acéphate (Orthène 50).

NERVATION NOIRE DES CRUCIFÈRES

Dans les plantations où la bactérie commence à se manifester on utilisera une spécialité à base de cuivre à raison de 2,5 kg/ha de cuivre métal. Quelques cultures présentent des symptômes très importants de décolorations suivies de nécroses, (environ 1/4 du feuillage détruit). Dans ce cas précis il est inutile d'intervenir.

P O I R E A U**TEIGNE, THRIPS**

Renouveler la protection à l'aide de : azinphos, cyperméthrine, deltaméthrine, méthidathion (voir bulletin n° 14 du 12 juin)

T O M A T E**NOCTUELLE (Heliothis armigera)**

Les vols sont importants. Sur les tomates d'arrière saison effectuer un traitement à l'aide de : deltaméthrine 1,25 g m.a./hl (Décis).

Tirage du 12 septembre 1985

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX - MONTPELLIER

© Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.